



Период беременности: 150-160 дней.

Отнимание от груди: в 4 месяца.

Половозрелость: самки в 2 года, самцы - 5 лет.

Продолжительность жизни: 10-13 лет.

Только до родов, самки отделяются от стада и находят недоступное место для того, чтобы родить. Мать и ее новорожденный детеныш остаются отдельными от стада в течение нескольких дней, в течение которых ягненок лежит неподвижно, в то время как его мать берет на непродолжительное время отходит от него для пропитания.

Популяционное деление составляет, по подсчетам ученых, 1.0-1.2 животных на квадратный километр. Также сообщалось о сезонных миграциях некоторых поселений (особенно самцов), в то время как общая тенденция свидетельствует о том, что эти животные предпочитают жить на более высоких возвышениях в летнее время. С относительно длинными ногами горные бараны - быстрые бегуны и могут убежать от хищников, хотя убежище часто они находят себе на крутых горных склонах. Первичные вокализации - сигнальный свист и шипение являются предупредительными звуками, которые производятся выдуванием воздуха через ноздри. Конкурируя, самцы приходят в ярость и становятся на задние ноги, наклоняясь вперед, нападая на своего противника, в процессе цепляясь рогами за рога противника.

Семейная группа: Стада, отдельные по полу (за исключением сезона спаривания) от 2 до более чем 100 особей.

Рацион питания: Травы, осоки.

Главные хищники: Волк, снежный леопард.

Распределение

Холмистый ландшафт около высоких гор на возвышениях 1 300-6 100 метров / 4 200-19 500 футов всюду по Средней Азии.

### Статус сохранения

Горный баран - уязвимая разновидность (IUCN, 2000). Подразновидности *O. a. amon*, *O. a. collium*, *O. a. hodgsonii*, *O. a. karelini*, и *O. a. polii* считают уязвимыми, *O. a. darwini* и *O. a. severtzovi* подвергаемые опасности исчезновения, и *O. a. jubata* и *O. a. nigrimontana* критически подвергаемые опасности полного исчезновения.